



La vaccination des femmes pendant la période de la grossesse permet de **les protéger** elles ainsi que **leur futur bébé dans les premiers mois de vie**.

- **Avant une grossesse** : mise à jour du statut vaccinal rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et varicelle, si indiqué(s), et au moins un mois avant la grossesse. Mise à jour des vaccinations du calendrier vaccinal général qui pourraient être en retard.
- **Pendant la grossesse** : vaccination contre la **grippe**, le **Covid-19**, la **coqueluche** et le **VRS**.
- **Après la grossesse** : mise à jour du statut vaccinal rougeole-oreillons-rubéole (ROR), coqueluche et varicelle si indiqué(s).

Mois	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	7 ^{ème}	8 ^{ème}	9 ^{ème}	Post-partum
SA ¹	3 à 6 SA	7 à 11 SA	12 à 15 SA	16 à 19 SA	20 à 24 SA	25 à 28 SA	29 à 32 SA	33 à 36 SA	37 à 41 SA	
Grippe	À n'importe quel stade de la grossesse, pendant la campagne de vaccination automnale									
Covid	À n'importe quel stade de la grossesse, pendant la campagne de vaccination automnale									
Coqueluche						À chaque grossesse, toute l'année				Si pas de vaccination pendant la grossesse : vacciner mère et entourage (stratégie du cocooning)
VRS (bronchiolite)								En amont/ pendant la saison épidémique ² (sept - janv), entre 32 et 36 SA		Si pas de vaccination pendant la grossesse : traitement préventif pour le nourrisson (anticorps monoclonal)

¹SA : semaine d'aménorrhée ; ²campagne 2025-2026 : à partir du 1er septembre 2025 (DGS-urgent 2025-15)

AVANT

Rubéole (ROR)³

Nées **avant 1980** et **non vaccinées** contre la rubéole (sérologie inutile).
1 dose de ROR (Priorix® ou M-M-RvaxPro®) (rougeole, oreillons, rubéole)

La rubéole peut être responsable de graves malformations chez le futur bébé.

Varicelle

En âge de procréer sans **antécédent de varicelle** (sérologie préalable possible).
2 doses (Varivax® ou Varilrix®)

Les femmes enceintes et leur fœtus présentent un risque de complications.

Autres vaccins

Mise à jour des vaccinations selon l'âge de la femme : dTP coqueluche, méningocoque, ROR (rougeole, oreillons, rubéole), HPV, etc. D'autres vaccins peuvent être nécessaires selon ses besoins spécifiques.

La rougeole durant la grossesse expose à un risque de complications pour la mère et l'enfant à naître.



PENDANT

Grippe

À n'importe quel stade de la grossesse.
1 dose (pendant la campagne de vaccination automnale - en attente vaccins disponibles campagne 2025-26)

Les femmes enceintes et leur fœtus présentent un risque accru de complications.

Covid-19

À n'importe quel stade de la grossesse.
1 dose (Pfizer JN.1®), pendant la campagne de vaccination automnale

Les femmes enceintes et leur fœtus présentent un risque accru de complications.

Coqueluche (dTcaPolio)³

À chaque grossesse, même si elle a été effectuée avant, **dès le 2^e trimestre** et de préférence entre 20 et 36 SA, toute l'année.
1 dose de dTcaPolio (Repevax® ou Boostrixtetra®); intervalle de 2 semaines avec le vaccin VRS.

La coqueluche peut se présenter sous forme maligne chez les nourrissons qui n'ont pas reçu des anticorps de leur mère via leur placenta.

Epidémie en cours



COQUELUCHE la vaccination de chaque femme enceinte et de tous les nourrissons, dès l'âge de 2 mois, est une priorité



VRS virus respiratoire syncytial (bronchiolite)

Si d'âge gestationnel compris entre **32 et 36 SA** en amont de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période.
Campagne 2025-26 : à partir du 1er septembre 2025
1 dose (Abrysvo®) (co-administration possible grippe et Covid-19; intervalle de 2 semaine avec dTcaP)

Permet le transfert d'anticorps maternels via le placenta protégeant le nouveau-né dès sa naissance contre les épidémies saisonnières de VRS.

Autres vaccins

La réalisation des autres vaccins au cours de la grossesse se justifie en cas de risque infectieux.

Les vaccins vivants atténués (ROR, varicelle, BCG, etc.) sont contre-indiqués pendant la grossesse. Une grossesse doit être évitée dans le mois qui suit la vaccination avec un vaccin vivant. Cependant, une vaccination réalisée chez la femme enceinte avec un vaccin vivant atténué n'est pas une indication pour interrompre la grossesse.

APRÈS

Rubéole (ROR)*

Mise à jour des vaccinations si n'a pas reçu deux doses de ROR (1 ou 2 doses de ROR selon vaccinations déjà réalisées), même en cas d'allaitement (en l'absence de suspicion ou confirmation d'une immunodéficience chez l'enfant)

Varicelle

N'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle suite à une première grossesse.

Coqueluche (dTcaPolio)*


Non vaccinées pendant la grossesse, même en cas d'allaitement.



³Les vaccins contre la rubéole ne sont disponibles que sous forme combinée (rougeole, oreillons, rubéole). Les vaccins contre la coqueluche ne sont disponibles que sous forme combinée (diphthérie tétanos coqueluche poliomyélite (dTcaP)).

LA VACCINATION PENDANT LA GROSSESSE

La vaccination pendant la grossesse permet de protéger la femme enceinte et le nouveau-né, dès sa naissance, contre certains virus et bactéries. Les anticorps produits par la mère grâce à la vaccination sont transférés au fœtus par le placenta :



PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Les vaccinations recommandées pendant la grossesse sont gratuites :

- Grippe : les femmes enceintes peuvent obtenir un bon de prise en charge afin de retirer gratuitement le vaccin en pharmacie.
- Covid-19 : le vaccin est mis à disposition gratuitement en pharmacie d'officine.
- A partir du 6ème mois de grossesse, les vaccins contre la coqueluche (dTPca) et le VRS sont pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie.

PROFESSIONNELS HABILITÉS À VACCINER

Professionnels habilités à vacciner les femmes enceintes :

- **Prescription** : médecins, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers, dans le respect des conditions de l'[arrêté du 08/08/2023](#).
- **Administration** : professionnels habilités à prescrire et préparateurs en pharmacie.

ÉPIDÉMIE DE COQUELUCHE - EN COURS

Mémo OMEDIT NA
vaccination coqueluche

Bulletin Santé publique France : Santé publique France rappelle l'importance de la vaccination contre la coqueluche à chaque grossesse (recommandée depuis avril 2022). Elle est la meilleure protection possible pour protéger les nourrissons avant qu'ils ne soient vaccinés.

La **vaccination des professionnels de santé et de la petite enfance est également essentielle pour protéger les nouveau-nés**, ainsi que dans certains cas, celle de l'entourage des nourrissons (cocooning).

POUR EN SAVOIR PLUS



Synthèses d'informations pour le grand public

- **Vaccination-info-service version grand public** : pages dédiées aux maladies mentionnées dans ce mémo et aux femmes enceintes ;
- **Santé publique France** (flyers) : coqueluche, gestes barrières en hiver, bronchiolite ;
- **Ministère de la santé** : flyer et FAQ Covid-19 ;
- **CPAM** : flyer grippe.



Synthèses d'information pour les professionnels

- **Boîte à outils OMEDIT NA vaccination** (<https://www.omedit-nag.fr/vaccination/boite-outils>) : mémos et jeux dédiés aux maladies mentionnées dans ce mémo ;
- **Vaccination-info-service version professionnelle** : pages dédiées aux maladies mentionnées dans ce mémo et aux femmes enceintes.



Réglementation et politiques vaccinales

- **Calendrier vaccinal de l'année en cours** : le document de référence précisant les recommandations vaccinales ;
- **DGS-urgent** : recommandations vaccinales actualisées selon les épidémies en cours, notamment coqueluche et VRS.



Données scientifiques

- **Santé publique France** : pour chaque maladie, couvertures vaccinales, données épidémiologiques et données cliniques.



Évaluations des recommandations vaccinales et des vaccins

- **HAS** (avis) : coqueluche 22/07/24, VRS femme enceinte 06/06/24, VRS protection des nourrissons 13/06/24.
- **HCSF** : avis relatif à la rougeole chez la femme enceinte